四庫全書

子部

普濟方卷一百四十四　明　周王朱橚　撰

傷寒門

傷寒後身體虛腫論

夫血氣滋榮外濡於腠理則形體充實傷寒汗下之後血氣不足臟腑虛寒榮衛澁滯津液不通肌肉無以充榮故令身體虛腫若脾與腎臟俱虛不能約制於水水氣流溢於皮膚則變水氣腫滿

方

黄耆湯　治傷寒後身體腫滿心胸壅悶喘促氣滿

黄耆一兩　枳殻去穣麩炒微黄三分　防風半兩　桂去麄皮半兩　細辛去苗葉半兩　白朮三分　赤芍藥　赤茯苓去黑皮三兩　當歸切焙半兩

右麄擣篩每服三錢水一盞入生薑半分切煎至六分去滓不計時候温服

防巳湯　治傷寒後身體浮腫喘息促小便不利坐卧不安

防己（三分）　猪苓（去黑皮三分）　海蛤（一兩）　陳橘皮（湯浸去白瓤焙一兩）　木香（半兩）　白术（半兩）　檳榔（剉一兩）　桑根白皮（剉三分）　赤茯苓（去黑皮三分）　木通（剉一兩半）　紫蘇葉

右麤擣篩每服三錢水一盞入生薑半分切煎至六分去滓不計時候温服

木通湯　治病後脾腎不足水道不利腰脚浮腫

木通（剉一兩）　澤瀉　防己　桑根白皮（炙黄色）　赤茯苓（去黑皮）　石葦（去毛各三分）　大腹子（微煨剉四兩）

右麄擣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食前

温服日三

防己湯　治病後氣虛津液不通皮膚虛滿

防己　黄耆剉　桂去麄皮各一兩半　赤茯苓去黑皮三兩　甘草炙令赤剉一兩

右麄擣篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓温服

日再服

檳榔湯　治傷寒病後脾腎氣虛欲成水病四肢面目

浮腫小便澁喘急

檳榔（幷皮剉五枚） 防已（二兩） 木通（剉碎一兩一分） 桑根白皮（炙令黄色剉一兩） 陳橘皮（湯浸去白焙乾三分） 吳茱萸（水浸一宿炒乾一分） 郁李仁（湯浸去皮微炒一兩）

右麁擣篩每服三錢水一盞半煎取七分去滓溫服日三

前胡丸 治傷寒身體浮腫心胸滿悶不欲飲食

前胡（去蘆頭一兩） 旋覆花（半兩） 人參（三分） 訶梨勒皮（一兩） 檳榔

剉一兩　木香半兩　赤茯苓去黑皮三分　陳橘皮湯浸去白瓤焙半兩　桂去麄皮半兩　桑根白皮剉三分　郁李仁湯浸去皮尖微炒一兩

右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服煎生薑棗湯下三十丸日三服

郁李仁湯　治傷寒後身體洪滿腹堅脹喘急不能飲食

郁李仁湯浸去皮尖微炒　大黃剉碎微炒各一兩　茈胡去苗　桑根白皮剉　澤瀉　赤芍藥　豬苓去黑皮　桔梗炒　麻黃去根

節各三分 鼈甲去裙襴醋炙 赤茯苓去黑皮各半兩 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右麄擣篩每服三錢水一盞入生薑半分切煎至六分去滓不計時候温服

木香丸 治傷寒後遍身洪腫

木香 肉豆蔻 青橘皮湯浸去白焙 檳榔微炒剉各一兩

右擣羅為末煉蜜為丸如小豆大每服空心温酒下二十丸漸加至三十丸

治病後虛腫

豉五升 醇酒一斗

右煮三沸及熱頓服不耐酒者隨性服覆取汗

五香麻黄湯 治傷寒忽發腫或着四肢或在胸背虛腫浮如吹狀亦著頭面唇口頸項劇者偏著脚䏶外如軸大而不痛不赤著四肢者乃欲不遂悉皆主之

麝香半兩 薰陸香 鷄舌香各一兩 沈香 秦艽 青木香 麻黄 防風 獨活 萎蕤 甘草各二兩

白薇　枳實各二兩

右㕮咀以水九升煮取三升分三服覆取汗後摩防

巳膏

傷寒後骨節煩疼附論

夫傷寒後骨節煩疼者由津液不足血脉皆虛餘毒客於經絡榮衛澁滯於骨節之間故令骨節煩疼也診三部脉細而遲澁者乃其候也

方

葛根湯　治傷寒後毒氣未解四肢少力骨節煩疼心腹脹滿

葛根剉　生乾地黄焙　羌活去蘆頭　桂去麄皮　芍藥　芎藭　麻黄去根節湯煮掠去沫　陳橘皮湯浸去白焙　木香各半兩　甘草炙剉一分

右麄擣篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎棗三枚擘破同煎至七分去滓空心温服晚食前再服

茈胡湯 治傷寒後百節疼痛壯熱頭疼

茈胡去苗 芍藥 知母焙 桃仁湯浸去皮尖雙仁炒黃 木香

山梔子仁 升麻 大青 白芷 黄芩去黑心各半兩

甘草炙剉一兩 石膏一兩

右麤擣篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎同

煎至七分去滓食前温服日三

茈胡飲 治傷寒後骨節疼痛咳嗽不能食口舌乾燥

乍寒乍熱脣口生瘡

茈胡（去苗）　升麻　茯神（去木）　芍藥　犀角（鎊）　百合　地骨皮　麥門冬（去心焙）　黄芩（去黑心）　人參（各半兩）　鼈甲（去裙襴醋炙）　石膏（各一兩）　甘草（炙剉一分）

右麄擣篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎竹葉三七片同煎至七分去滓食前溫服日再

芍藥湯　治傷寒後壯熱骨肉疼痛頭重嘔噦

芍藥　茈胡（去苗）　赤茯苓（去黑心）　人參　麥門冬（去心焙）　藿香葉　白芷（各半兩）　生蘆根（一兩）　甘草（炙一分）

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎同煎至七分去滓空心温服晚食前再服

百合湯 治傷寒後四肢煩熱骨節疼痛

百合 知母焙 鼈甲去裙襴醋炙 柴胡去苗 葛根剉 桑根白皮剉各一兩

右麄搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓入生地黄汁一合攪匀食後温服日再

茯苓湯 治傷寒後骨節煩疼乍起眼暗氣衝胸背上

氣滿急

白茯苓去黑皮　柴胡去苗　桔梗炒　細辛去苗葉　芍藥　大腹皮各半兩　枳殻去穰麩炒　陳橘皮湯浸去白穰焙各一兩　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒三分　甘草炙一分

右麄擣篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎同煎至八分去滓食後温服日再

補氣

黄耆湯　治傷寒後骨節煩疼不欲飲食即氣脹汗出

黄耆（剉） 芍藥 桂（去麄皮） 麥門冬（去心焙） 五味子 前胡（去蘆頭） 白茯苓（去黑皮） 當歸（切焙） 人參（各半兩） 甘草（炙一分）

右麄擣篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎棗三枚擘破同煎至七分去滓温服日三

防風湯 治傷寒後遍身骨節疼痛脚膝無力

防風（去蘆） 白术 附子（炮裂去皮臍） 白鮮皮 黄耆 桂（去麄皮） 薏苡仁（各一兩）

右剉如麻豆每服三錢水一盞入生薑半分拍碎同

煎至半盞去滓溫服日三

羌活湯　治傷寒後下焦風虛骨髓痠痛腰脚頑痺不能久立日漸消瘦

羌活（去蘆頭）　防風（去蘆）　五加皮　牛膝（去苗酒浸切焙）　酸棗仁（微炒）　丹參　芎藭　麻黃（去根節湯煮掠去沫焙）　當歸（切焙）　獨活　檳榔　玄參（堅者）　木通（剉各半兩）　桂（去麄皮）　黃耆（剉各三分）

右麄擣篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓空心溫服日晚再服

續斷湯（出護命方）治傷寒熱毒氣攻腎腰背疼痛脊膂强急頭不痛左手尺脈浮微數

續斷　杜仲（去麄皮炙剉）　羌活（去蘆頭）　麻黄（去根節湯煑掠去沫焙）　芎藭（各一兩）　牽牛（一分熟炒）

右麄擣篩每服三錢水一盞煎至二沸去滓空心服

桂枝芍藥知母湯（出金匱方）治諸肢節疼痛身體魁瘰脚腫如脫頭眩短氣溫溫欲吐

桂枝（四兩）　芍藥（三兩）　甘草（二兩）　麻黄（二兩）　生薑（五兩）　白术（五兩）　知

母四兩 防風四兩 附子二兩炮

右以水七升煮取二升溫服七合日三服

柴胡散 治傷寒壯熱肢節疼痛大小便澁

柴胡去苗 黄芩去黑心 栝蔞根 山梔子仁各一兩 大黄剉醋炙 芒硝各一兩半 木香 白鮮皮各三分 茵蔯蒿半兩

右搗羅為細散每服二錢食前新汲水調下

神解丸出御藥院 治内外所傷骨節疼痛壯熱增寒頭疼身體拘急

硃砂研 硼砂研 黄蠟各等分

右鎔蠟和成劑旋丸如菉豆大每服一丸冷水送下如人行一二里地以熟葱醋粥投汗出解

正元散出拔萃方 治傷寒始覺吹凍著四肢頭目百節疼痛急煎此服如人行五里再服或連三服汗出立差若患陰毒傷入退陰散半錢同煎或寒冷傷食頭疼氣滿及心腹諸疾服之無有不效退陰散方見婦人諸疾門傷寒類

麻黄 陳皮 甘草 乾薑 肉桂 白芍藥

大黃 附子 吳茱萸 半夏各等分皆可製

右麻黃加一半茱萸減一半同為末每服一大錢水一盞生薑五片棗一枚煎七分熱呷出汗以被蓋覆汗出愈陰毒不可用麻黃出汗

天麻散出王氏博濟方 解傷寒渾身壯熱百節疼痛頭昏重面赤氣麄脈息洪大大效

天麻三兩 烏頭一兩半 天南星二兩 防風 白附子一兩 雄黃半兩 麝香少許

右為細末每服一字溫酒調下併喫三兩服汗出立差

橘皮湯永類鈐方治動氣在下不可發汗發之反無汗心中大煩骨節疼痛目暈惡寒反嘔逆穀不得入

淨陳皮一兩半　甘草半兩炙　人參一分　竹茹半兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎空心服

活人書加生薑一兩棗子八個作六服

傷寒後腰脚疼痛論

夫腰者腎之府腎者主水受五臓六腑之精而藏之傷寒病後精血不足腎氣既弱風邪襲虚客搏於足少隂之經留注腰脚凝滞不散故機關不利為腰脚疼痛亦有宿患腎經風温腰痛因病後下經氣虚而發者各從其症以方治之

方

羌活散　出聖惠方　治傷寒後風虚腰脚頑痺骨髓疼痛不能久立

羌活 防風去蘆頭 黄耆 五加皮 牛膝去苗各二兩

酸棗仁微炒 丹參 桂心 赤芍藥 麻黄去根節 檳

榔 當歸 木通 玄參各一兩 枳實半兩麩炒微黄

右細剉和匀每服半兩水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓食前温服服藥訖即以衣覆卧良久即

愈

麻黄散出聖惠方 治傷寒後風毒攻腰脚骨節疼痛

麻黄一兩半去根節 細辛 獨活 桂心 防風去蘆頭 當

歸　羚羊角屑已上各一兩　丹參　牛膝去苗　萆薢剉　黄耆剉各三分　磁石二兩搗碎小淘去赤水

右為散每服四錢以水一中盞入生薑三片煎至六分去滓食前温服

大腹皮散出聖惠方　治傷寒肝腎風虚毒氣壅滯大小腸閉澀氣攻腰脚疼痛妨悶

大腹皮剉　桂心　澤瀉　赤芍藥各一兩　檳榔　木香各半兩　木通　川朴硝各三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前温服

牛膝散出聖惠方治傷寒後臟腑虚弱腰脇疼痛瘦痒

牛膝去苗 石斛去根剉 薯蕷 赤芍藥 杜仲去麄皮炙微黄 萆薢剉 剉各三分 當歸剉微炒 熟乾地黄各一兩 桑寄生

右為散每服五錢水一中盞入酒三合生薑半分煎至六分去滓食前温服服藥後徐步令藥勢行

獨活散出聖惠方治傷寒後腎臓風虚脚膝疼痛少力不能

步

獨活一兩 防風三分去蘆頭 五加皮三分剉 附子一兩炮製去皮臍

赤芍藥一兩 乾薑半兩炮 桂心一兩半 牛膝去苗一兩 五味子三分

杜仲一兩半去麄皮炙微黃剉 石斛去根一兩 沈香一兩

右為散每服五錢以水一大盞入薑半分煎至五分

去滓食前溫服

桂心散出聖惠方 治傷寒後腹脹氣急連腰脚疼痛

桂心 陳橘皮湯浸去白瓤焙 白朮 附子炮製去皮臍 當歸

木香各半兩　檳榔一兩　厚朴去麄皮塗生薑汁炙令香熟半兩

右為細散每服食前以酒調下二錢

檳榔丸出聖惠方　治傷寒後虛冷腰間有積滯氣流注腰脚疼痛不可忍

檳榔　陳橘皮湯浸去白穰焙　桂心　附子炮製去皮臍　赤芍藥各半兩　乾薑一分炮製剉　牽牛子五兩微炒別杵羅取末二兩半聖濟入糯米百粒同炒米色黃取末三兩

右為細末研令勻煉蜜和丸如梧桐子大食前以生

薑湯温下三十丸相次以生薑粥飲投之良久當利未利再服聖濟云為散入牽牛子末和令匀每服空心温酒調下三錢每服藥了喫少薑粥投良久利下腰間積滞物如不利即加至四錢以利為度名檳榔散

沈香散聖惠方治傷寒後腰間氣滞流注脚膝疼痛

沈香　附子半兩炮裂去皮臍　五加皮各一兩　桂心一兩　檳榔一兩　枳實半兩麩炒微黄　木香半兩　大黄一兩剉碎微炒

右為細散每服食前以葱白湯調下二錢

葳靈仙散出聖惠方治傷寒後腰脚疼痛

葳靈仙一兩半　牽牛子二兩微炒　陳橘皮三分湯浸去白瓤焙　厚朴三分去麄皮塗生姜汁炙令香熟　吴茱萸半兩湯浸九遍曝乾

右為細散空心以温酒調下二錢當瀉下惡物

治傷寒後肩背拘急腰脚疼痛出聖惠方

羌活　乾薄荷各一兩　木香　檳榔各三分　葳靈仙

右為細散每服食前以温酒調下二錢

貼熁方 出聖惠方 治傷寒後風氣流注腰脚疼痛坐卧有妨

附子 生用 桂心 各半兩 吳茱萸 一分生用

右為末用生薑自然汁調令稀稠得所入銚子内慢火煎如餳攤在臘紙上於痛處貼熁之

芫花散熨方 出聖惠方 治傷寒後毒氣攻注腰脚疼痛

芫花 吳茱萸 各二兩 醋糟 八兩

右相和令匀於銚子内炒令熟以青布裹於痛處熨之如稍乾以醋拌令潤再炒熨之以痛止為度

治傷寒後毒氣傷於經脈即致腰脚疼痛 出聖惠方

鹿角 一具長三寸截之 酒 七升

右先用鹿角以炭火燒令通赤内於酒中蘸如此五度止浸經一宿每服空心及晚食前煖一中盞服

獨活湯 治傷寒後風虛邪氣流注腰膝冷疼脚膝無力

獨活 去蘆頭一兩 防風 去蘆三分 五加皮 二分 芎藭 一兩 乾薑 炮製一兩 附子 炮製去皮臍一兩 桂 去麁皮一兩 五味子 炒三分 牛膝 去苗

湯浸切焙一兩 杜仲去麄皮炙剉一兩

右剉如麻豆每服五錢用水一盞半煎至七分去滓食前温服

防風湯出濟生拔萃方 治傷寒後腰痛或皮内瘰痺腿膝疼痛行履艱難不可俯仰

防風去蘆一兩 麻黄去根節三分 桂去麄皮三分 牛膝去苗酒浸切焙一兩

丹參半兩 五加皮半兩 杜仲去麄皮炙剉三分 附子炮製去皮臍一兩

芎藭三分 細辛去苗葉半兩 當歸切焙一兩 羌活去蘆頭一兩 芍藥

一兩 續斷一兩

右剉如麻豆每服五錢用水一盞半入生薑半分拍碎同煎至七分去滓食前溫服

乳香丸 治傷寒後腎臟氣虛腰疼

乳香半錢 地龍微炒一兩 當歸切焙一兩 烏頭去皮臍生用一分 桂去麤皮半兩 乾蠍微炒去足半兩 附子炮製去皮臍一兩

右為末用安息香一剉酒浸一宿細研淘濾去滓慢火煎成膏同藥末研令勻煉蜜和丸如菉豆大每

服空心温酒送下五丸至十丸

杜仲丸　治傷寒後風傷腰膝冷痛兼補益元臟

杜仲去麄皮炙剉一兩半　乾漆炒令烟出一兩半　桂去麄皮一兩　牛膝去苗酒浸切焙一兩　巴戟天去心一兩半　五加皮剉一兩　附子炮製去皮臍一兩　山茱萸一兩　狗脊去毛一兩　防風去蘆半兩　獨活去蘆頭一兩　山芋一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒下

敗龜散　治傷寒後腰痛行履不得

敗龜醋浸炙　虎骨塗酥炙　補骨脂微炒　當歸切焙　赤芍藥各一兩　薰陸香　桂去麄皮　白芷各半兩

右為細散每服食前熱酒調下二錢日二服

當歸散　治傷寒後腰間冷痛

當歸切焙　桂去麄皮各一兩　牡丹皮　附子炮製去皮臍各半兩

右為細散每服空心温酒調下二錢晚再服

沒藥散　治傷寒後腰痛不可忍

沒藥一兩研　地龍一兩研　桂去麄皮半兩

右研為細散每服空心溫酒調下二錢

芫花散　治傷寒後風虛氣滯冷腰胯疼痛坐卧艱難

芫花二兩　吳茱萸一兩半　芸薹子一兩

右為散每服用散半匙以糯米糟一兩入酒煑如糊

攤於臘紙上貼痛處

牛膝煎　治傷寒後或中風濕毒氣流注腰脊日夜疼

痛

牛膝（去苗） 天麻 附子（炮製去皮臍生用） 羌活（去蘆頭各二兩） 當歸（切焙一兩）

右為末用黑豆二升桑枝三斤細剉生薑四兩切用水二斛煎至二升半去滓入藥末煎成膏每服空心温酒調下半匙日晚再服

牛膝散（出活人書方） 治傷寒汗出不徹濕毒留客肢體攣急腰脚不得屈伸

牛膝 麻黄（去根節） 地龍 天南星（各二兩） 惡實根（十條）

右先將惡實根去皮細剉幷諸藥入在沙盆内細研後用法酒一升再研匀爛用新布絞取汁後用炭半秤燒一地坑子令通赤後去火掃淨投藥汁於坑子内再以火燒令黑色取出於乳鉢内研細每服半錢温酒調下日三服並無所忌

治傷寒發汗吐下後體虛元藏積冷氣刺腰痛轉動艱難

原蠶沙 半斤 糯米 半升

右二味同炒令米色焦然後擣羅為末每用半兩以米醋調如稀糊入銚子内煎攪令稠及熱攤於蠟紙上貼痛處以帛纏縛冷即易之

杜仲酒　治傷寒後體虛元藏挾風冷腰膝疼痛行履不得

杜仲（去麄皮炙剉二兩）　獨活（去蘆頭半兩）　附子（炮製去皮臍）　牛膝（去苗一兩）　仙靈脾（三分）

右剉細用生絹袋盛以酒五升浸密封頭經七日後

開每日取三二合温服日可三服未瘥再浸服

治傷寒熱毒攻腎腰背疼痛脊背强急頭不痛診其左手尺脈浮微數即宜喫此方出護命方

續斷　杜仲　麻黄　羌活　芎各一分　牽牛一分熟炒一銖

右杵羅為末每服二錢水一盞煎一沸便瀉出空心喫見得不子細毋服

傷寒後咽喉閉塞不通附論

夫咽喉閉塞不通者脾肺壅滯風毒藴積内搏經絡上

攻咽喉也足太陽之脉上膈夾咽而喉則肺氣之所通故脾肺壅熱則咽喉閉塞凡傷寒後餘毒未盡上攻咽喉故亦令閉塞不通也

方

當歸湯　治傷寒後咽喉閉塞疼痛六七日其人大利後脉沈遲手足厥逆下部脉不至咽喉痛不利唾膿血泄利不止

當歸切焙　升麻　知母　萎蕤　黄芩去黑心　麥門冬

去心焙各半兩桂去麤皮芍藥乾薑炮石膏白茯苓去黑心甘草白朮各一分麻黄去根節一兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫服日三

黄芩湯治傷寒後咽喉瘡痛口瘡煩躁頭痛毒氣上攻

黄芩去黑心大青山梔子仁甘草炙剉各半兩升麻麥門冬去心焙各三分

右麄擣篩每服三錢水一盞入竹葉七片煎至六分去滓食前温服日三五服

升麻湯 治傷寒後咽喉疼痛閉塞不通毒氣上攻

升麻 木通剉各一兩 射干 羚羊角鎊 芍藥各半兩 蘆根一握

右麄擣篩每服三錢水一盞煎至六分去滓温服日三

地黄湯 治傷寒後舌根腫塞喉痺此為脾虚心熱先

針舌下兩邊出血次服此方

生地黄二兩切　甘草剉炙　大黄各半兩　升麻三分　車前子一兩

右麄擣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓下朴硝末一錢攪勻食後温服日三

葛根湯　治傷寒後咽喉疼痛

葛根剉　青竹茹各一兩　倉粳米一合

右麄擣篩每服三錢水一盞入生薑一棗大拍碎煎至六分去滓日後温服日三

升麻丸　治傷寒後喉內生瘡及喉腫塞毒熱上衝

升麻　苦藥子　鉛丹炒　大黃生用各半兩

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸綿裹噙津化

盡再服

丹參煎　治傷寒時行咽喉閉塞及賊風毒氣上攻

丹參二兩　蒴藋根剉　羊躑躅炒　甘菊花　莽草各半兩

秦艽去苗土一兩半　牛膝去苗酒浸　羌活去蘆頭　烏頭鹽炒去皮臍　連

翹　蜀椒去目閉口炒出汗　白朮各一兩

右㕮咀如麻豆大以苦酒半升拌匀漬半日先取油二斤煉香熟旋旋下藥煎候白朮赤色即下煉了猪脂一斤更煎藥赤黑色停温綿濾過瓷合盛每服取如半棗大含化稍嚥之熱毒罷服齒痛綿裹嚼之嚥下

地黄煎　治傷寒後咽喉不能嚥人口生瘡積熱上攻涎出不止

生地黄汁（二合）　鉛丹（炒二兩）　白蜜（二兩）　猪牙皂莢（一挺去皮酥炙）

為末

右和勻以瓶子盛蜜封頭飯上蒸一時久去滓收之

每服一匙頭含化嚥津

貼喉膏　治傷寒後咽喉痛舌強餘熱上攻

蜜半斤　甘草剉二兩　猪脂四兩

右先以猪脂與蜜煉消後入甘草煎候甘草赤黑色

以綿濾過瓷合收盛每取如半棗大含化嚥津

射干煎　治傷寒熱病後咽喉疼痛閉塞不通毒熱上

攻

射干半斤　猪脂一斤

為末

右先煎猪脂沸次下射干候射干黑色以綿濾過瓷合盛綿裹如彈子大含化嚥之

治傷寒後熱咽喉疼痛閉塞不通氣上衝方

右取蔄茹少許如爪甲尖內口中微嚼汁

治傷寒熱病後咽喉腫痛閉塞不通氣上衝方

右取商陸根切炒令熟以布裹熨腫上冷復易之

治傷寒熱病後咽喉腫痛閉塞不通毒氣上衝方

右取黄明膠手掌大一片以水煑輭貼頸外瘥

治傷寒熱病後咽喉疼痛閉塞不通毒氣上衝方

右以白礬以綿裹含之細細嚥汁以通為度

治傷寒熱毒攻肺上衝咽喉心胸壅實隔塞不通渾身大熱面色白非時氣喘痰堅不快診其脉右手寸口脉一指偏大如衆即宜服此方出護命方

麻黄去根半兩　杏仁　紫菀　貝母去心　柴胡去苗　黄芩

桔梗　射干　大黃　牡丹皮去心　麥門冬去心　羌活

葶藶各一分　半夏二銖　牽牛二兩

右除牽牛半夏二味別作一處杵羅為末所餘只合

作一處杵羅為末每服六錢衆藥末四錢生薑五

片水兩盞煎一兩沸便瀉出用調下牽牛半夏末

二錢作一服食後臨卧時喫

傷寒後失音不語

夫傷寒後失音不語者由風寒客於厭會厭為音聲之

户邪氣傷之故卒然無音人肺正聲而通於氣人之五臟有五音皆稟氣而通之若邪客於肺則氣道不調亦令人語無音聲治法當隨其輕重以方制之失音者歌曰失音發痓反張弓狝惑唇瘡瘂似聾風温血迷并舌卷更兼中暑語難通言心聲也聲音道路出於咽喉肺亦主之若風若痰若血若熱與夫邪熱伏於心竅或滯於喉間令人失音或語不出而聲蹇澁也

方

五味子湯 治傷寒後外邪客於肺卒失音

五味子 桂去麄皮各一兩半 甘草炙剉半兩 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒

一兩

右麄擣篩每服五錢水一盞半生薑三片煎至一盞

去滓不計時候溫服

杏仁煎　治傷寒後忽暴嗽失音語不出

杏仁（湯浸去皮尖雙仁研一兩）　木通（剉）　貝母（去心）　紫苑（去苗土）　五味子　百合　桑根白皮（切各一兩）　生薑汁（半兩）　沙糖（四兩）　蜜（四兩）

右除杏仁薑汁糖蜜外細剉用水五盞煎至三盞去

滓下杏仁膏薑汁糖蜜等相和微火再煎如稀餳以净器盛每半匙水一盞煎開温服不計時候

豆竹湯　治傷寒失音不語

黑豆淘洗半升　青竹如算子四十九莖各長四寸

右用水五大盞同煎以豆熟為度去滓分温三服

麻仁飲　治傷寒卒失音牙關緊急

大麻仁半升　羚羊角屑二兩

右㕮咀每服五錢酒水各一盞共煎一盞去滓温服

日再服

羚羊角散　治傷寒失音不知人口眼不正舌強

羚羊角屑一兩　麻黄去根節　石膏各半兩　防風去蘆　麥門冬去心焙　黄芩去黑心　乾薑剉　升麻各三分　桂皮焙

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後溫服日三服

防己湯　治傷寒後失音不能語口噤

防己剉　桂去麄皮　麻黄去根　葛根剉各一兩　甘草炙　防風去蘆

芍藥半兩

右麄擣篩每服五錢水一盞半生薑三片同煎至一盞去滓空心温服日再服

升麻飲 治傷寒失音不語神志昏冒

升麻一兩 桂去麄皮三分 木通剉二兩 防風

右麄擣篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓下竹瀝半合攪令匀空心温服

三瀝湯 治傷寒失音不語

竹瀝　梨汁　荆瀝各二合　陳醬汁半合

右攪令匀以綿濾過分温四服空心日晚各一服

桂心湯　治傷寒邪氣傷肺失音不語

桂心去麄皮二兩　菖蒲去鬚一兩

右麄擣篩每服三錢用水一盞煎至七分去滓不計時候温服衣覆取汗未退再服

芥子酒熨方　治傷寒後肺中風冷失音不語

右用白芥子五合研碎用酒煑令半熟帶熱包裹熨

項頸周遭冷則易之

治傷寒後失音不語方

右用蘿蔔自然汁入少生薑汁飲一盞如無以蘿蔔子入水研服

三奇湯出家藏方 治傷寒語聲不出

桔梗一兩判蜜拌皰上蒸 甘草五錢半生半炒 訶子大者四個

右為細末每十錢以水沙糖一小塊水五盞煎至三盞時時細呷一日服盡效甚速聲未出再服

傷寒咽喉痛類

五拗湯 出仁存方 治感寒而語聲不出或至咽喉腫痛 方見本門

瘵暴中冷傷寒鼻塞喘嗽喉中瘂塞失音聲者 出本草

右取芫花根一虎口切暴乾令病人以薦自縈就裏舂芫花根令飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆羅刺畢畢耳勿住令芫根盡則止病必於此差

傷寒後虛羸論

夫傷寒之病多因發汗吐下乃解病雖差然臟腑俱傷

榮衛皆耗穀氣未復津液不足無以克養故形體虛羸內經所謂必養必和待其來復者此也若其人本自虛弱又因大病之後羸劣不復者則易生勞傷諸疾當先以氣味和養後以藥石療治曰氣味合而服之以補精益氣或其人血氣先虛復為虛邪所中發汗吐下之後經絡俱損傷陰陽竭絶熱邪始散真氣尚少五臟猶虛穀氣未復無津液以養榮故虛羸而生病焉

方

陳橘皮(出聖惠方)治傷寒後虛羸少氣嘔吐不納飲食

陳橘皮(一兩湯浸去白焙) 五味子(一兩) 麥門冬(去心焙一兩半) 人參(一兩去蘆頭) 半夏(一兩湯洗七遍去滑) 白朮(半兩) 甘草(半兩炙微赤剉) 白茯苓(三分) 黃耆(三分)

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

白朮散(出聖惠方)治傷寒後虛羸少力不思飲食

白朮(一兩) 黃耆(剉一兩) 麥門冬(去心一兩) 人參(去蘆頭一兩) 桂心

陳橘皮(三分湯浸去白瓤焙半兩)

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

草豆蔻散(出聖惠方)治傷寒後脾胃氣弱痰逆不思飲食四肢虛羸

草豆蔻(去皮三分) 藿香(一兩) 桂心(三分) 白朮(一兩) 人參(去蘆頭一兩)

黄耆(剉一兩) 甘草(半兩炙微赤剉) 半夏(半兩湯浸七遍去滑)

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候稍熱服

人參散出聖惠方治傷寒重病後四肢沉困肢體酸疼翕翕少氣或兩脇拘急腰背強直面少顏色不能飲食漸至虛羸

人參去蘆頭一兩　白茯苓一兩　黄耆半兩剉　熟乾地黄一兩半

肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾　五味子一兩　附子一兩炮製去皮臍

陳橘皮三分湯浸去白焙　半夏三分湯洗七遍去滑　柴胡一兩去苗　桂心一兩　白朮三分

右為散每服五錢以水一盞半入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候稍熱服

桂心散出聖惠方治傷寒虛羸黄瘦五臟氣乏

桂心一兩　人參去蘆頭一兩　黄耆一兩剉　甘草半兩炙微赤剉　白茯苓三分　肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓食前稍熱服

黄耆散出聖惠方治傷寒後虛羸乏力肢體疼痛少思飲食

黃耆一兩剉 白芍藥三分 桂心三分 人參去蘆頭半兩 甘草半兩炙微赤剉 五味子三分 白朮半兩 當歸三分剉微炒 牛膝去苗一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓食前稍熱服

附子散一名沈香散聖惠方 治傷寒腎臟虛羸耳無所聞脚膝乏力

芎藭三分 熟乾地黃一兩半 桂心三分 人參去蘆頭三分 白茯苓一兩 桑螵蛸微炒一兩 當歸剉微炒三分 沈香一兩 牛膝一兩去苗

石斛去根一兩 附子一兩炮製去皮臍 磁石二兩搗碎淘去赤汁 肉蓯蓉酒浸二宿刮去皺皮一兩炙乾

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓食前稍熱服

人參散出聖惠方 治傷寒後虛羸不足五臟氣乏

人參去蘆頭半兩 桂心半兩 乾薑半兩炮製剉 半夏半兩湯浸七遍去滑

黃耆剉一兩 白芍藥半兩 甘草一分炙微赤剉 五味子半兩 熟乾地黃一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓食前稍熱服

黄耆散　出聖惠方　治傷寒後體氣虛羸四肢黄瘦不思飲食

黄耆剉一兩　牛膝去苗一兩　附子一兩炮製去皮臍　甘草半兩炙微赤剉　人參去蘆頭一兩　白茯苓三分　五味子三分　木香半兩　白芍藥三分　熟乾地黄一兩　桂心一兩　柴胡去苗一兩　當歸半兩剉微炒　半夏湯浸七遍去滑　陳橘皮各三分湯浸去白穰焙

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓食前稍温服

沈香丸出聖惠方治傷寒後虚氣上衝心胸滿悶連背急痛惡風食少漸加虚羸

沈香一兩 芎藭一兩 茯神一兩 人參去蘆頭一兩 桂心三分 當歸一兩剉微炒 枳殼麩炒微黄去瓤 甘草炙微赤剉各半兩 白朮一兩 五味子三分 訶梨勒皮一兩半用皮 木香一兩

右為末煉蜜和丸擣三二百杵丸如梧桐子大每服以薑棗湯下三十丸食前服

黄耆丸（出聖惠方）治傷寒後風虛氣滿背膊煩疼不能飲食四肢無力時復盜汗日漸虛羸

黄耆（一兩）　檳榔（三分）　桔梗（去蘆頭半兩）　枳殻（半兩麩炒微黄去穰）　桂心（三分）　當歸（半兩剉微炒）　陳橘皮（三分湯浸去穰焙）　牡蠣（一兩燒為粉）　附子（一兩炮去皮臍）　厚朴（三分去麄皮塗生姜汁炙令香熟）　人參（去蘆頭三分）　茯神（三分）　甘草（半兩炙微赤剉）　木香（半兩）　薯蕷（三分）　白朮（三分）　乾薑（半兩炮裂剉）　龍骨（三分）

右為末煉蜜和擣三二百杵如梧桐子大每服食前

以粥飲下三十九

人參湯　治傷寒後虛羸少力嘔噦氣逆

人參　白茯苓去黑皮各二分　麥門冬去心焙　黄耆剉各一兩　白术　半夏湯浸洗七遍炒乾　陳橘皮湯浸去白焙各半兩　甘草炙一分

右麤擣篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓食前溫服

附子湯　治傷寒後虛羸少力補益元臟

附子炮製去皮臍 萆薢 熟乾地黃焙 人參各一兩 芎藭

半夏湯洗七遍炒各半兩 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 當歸 芍藥

五味子 黃耆剉各三分

右剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓空心溫服

芘胡知母湯 治傷寒後體虛成勞遍身盜汗四肢無力口苦憎寒又多咳嗽

芘胡 知母 桔梗炒 厚朴去粗皮生薑汁炙 熟乾地黃

焙白茯苓（去黑皮）山芋 黄耆（剉）紫菀（去土）地骨皮（各一兩）黄芩（去黑心半兩）甘草（炙剉）桂（去粗皮）半夏（湯洗七遍炒各三分）

右麄擣篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓空心溫服日再

桂心湯 治傷寒後虛勞羸瘦乏力

桂（去粗皮）人參 黄耆（剉）牛膝（酒浸切焙各一分）甘草（炙剉）白茯苓（去黑皮三分）

右麄擣篩每服五錢水一盞入生薑三片棗二枚擘

破同煎至六分去滓空心温服

黄耆芍藥湯 治傷寒後氣血不復虛羸

黄耆剉 人參各一兩 芍藥 桂去粗皮 五味子各三分 白朮半兩 甘草炙剉一兩

右麄擣篩每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至六分去滓空心温服

黄耆薑桂湯 治傷寒後臟氣不足虛乏

黄耆剉一兩 桂去粗皮 乾薑炮 芍藥各半兩 甘草炙剉一分半

夏三分浸洗七遍炒 人參

右麄擣篩每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至六分去滓空心温服

黄耆甘草湯 治傷寒後虛勞短氣小腸急痛羸劣

黄耆 白茯苓去黑皮 芍藥 白术 甘草各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞半入生薑一棗大拍碎棗三枚擘破同煎至六分去滓空心温服

黄耆雞白湯 治傷寒後臟氣俱虛羸劣不足

黄耆　白茯苓去黑皮　五味子　白术各半兩　薤白

葱白三莖　粳米　芍藥　生薑各半兩　羊腎一雙去脂膜

右細剉分作三分每服用水二盞煎至一盞去滓食前温服一日服盡

黄耆薑桂湯　治傷寒後臟氣不足虚乏

黄耆　桂去粗皮　乾薑炮　人參　芍藥各半兩　甘草炙剉

一分　半夏三分湯洗七遍炒

右麄擣篩每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚劈

破同煎至六分去滓空心溫服

乾地黃湯　治傷寒後血氣不足脚膝無力四肢羸劣

熟乾地黃（焙）　地骨皮　五味子（各一兩）　桂（去粗皮半兩）　黃耆（剉一兩半）

右麤擣篩每服五錢水一盞半先將羊腎一雙去筋膜切煮至一盞次下藥更煎至七分去滓空心溫服

白朮黃耆湯　治傷寒胃氣虛乏不思飲食日漸羸瘦

白朮　黃耆（剉各一兩）　山茱萸　五味子　人參　茯

神木去 半夏湯洗七遍炒 前胡去蘆頭 山芋 桔梗炒各半兩

右麄擣篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎同煎至八分去滓空心溫服

羚羊角湯 治傷寒後煩熱憎寒口苦不思飲食日漸羸瘦

羚羊角鎊 柴胡 鼈甲去裙襴醋炙 人參 知母 淡竹茹 黄耆 赤茯苓去黑皮 甘草炙各半兩 天門冬去心焙一兩

右細剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至八分去滓

食前温服日二

治傷寒後虛羸少氣嘔吐方出千金方

石膏　麥門冬　半夏各一分　竹葉二把　人參一兩

右㕮咀以水一斗煑取六升去滓内粳米一升米熟

湯成飲一升日三服一方加生薑五兩甘草二兩

生地黄湯出千金方治傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃中有

宿食大便不利

生地黄三斤　大黄四兩　大棗二十枚擘　甘草一兩炙　芒硝二合

右合擣五升米下熟絞取汁分再服忌海藻菘菜

雞子豉湯　治吐下虛羸欲死

雞子一十枚　豉四合綿裹

右以水五升先煑雞子取二升內豉又煑三四沸去滓分再服

補虛大病後不足萬病虛勞同此出千金方

右以取五歲已上七歲以下黄牛新生者乳一升以水四升煎

取一升如人饑稍稍飲之不得過多十日不住服佳

羌活附子湯出飽氏方治傷寒汗下後虛中為冷藥所寒中焦痞滿而嘔

羌活　附子　茴香各半兩　木香　乾薑各一棗大

右為末每服二錢少鹽煎食前

內感傷寒勞役形體飲食失節中州變寒之病生黃非瘀之而得用建中理中大建中足矣不足用茵蔯也男黃小便自利當與虛勞小建中湯若黃疸色不變欲自利腹滿而喘不可除熱除熱必噦小半夏湯韓氏曰産脫血虛者

宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡陽失血則用救逆效必遲矣與羊肉湯為效神速病人面色雖見陽是客熱上焦中下二焦陰氣已盛若調得下焦有陽上焦陽氣下降丹田知所歸宿矣氣有高下病有遠近症有中外治有輕重各適其所為病八九日汗下太過二脈沈細無力多踡足卧惡聞得人聲皮有粒時戰如瘧宜羊肉湯主之羊肉湯方出拔萃方

當歸 白芍藥各一兩 黑附子四錢炮製去皮臍 龍骨半兩燒通赤 生薑二兩 牡蠣一兩燒赤 桂枝七錢半

右爲麄末每服二兩羊肉四兩葱白五寸去黄心同剉爛以水五升一升今之一大盞也熬至一半以絹濾絞去滓分三服飲之海云陽症大汗大下後亡陽于外亡血于内上而津脱下而液脱津液兩亡宜以此湯補之矧隂症者豈可不温補哉此與傷寒太陽症振揺與真武湯一例外之陽病至此尚温况内之隂候豈得不補耶

傷寒後虚損夢洩論

夫傷寒後虛損夢洩者由邪熱乘於腎則陰氣虛陰氣虛則夢交通腎臟主於精合腎虛不能制於精故因而夢洩也

方

白芍藥散出聖惠方治傷寒後虛損小腹拘急腰背强疼夜夢失精四肢羸瘦

白芍藥　桂心　白朮　人參去蘆頭　白茯苓　五加皮　乾薑三分炮裂剉　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

龍骨散（出聖惠方）治傷寒後虛煩夜夢失精頭目眩疼四肢羸劣

龍骨　白薇　牡蠣　白芍藥（各一兩）　甘草　附子（三分炮製去皮臍）

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓食前溫服

薰草散（出聖惠方）治傷寒虛損腎氣不足夜夢失精

薰草　龍骨（二兩）　桂心　白朮（三分）　人參（去蘆頭）　茯神

熟地黃（二兩）　甘草（炙微赤剉）　白芍藥（各三分）

右為散每服五錢以水一大盞入棗三枚煎至五分

去滓食前溫服

治傷寒後腎氣虛損夜夢失精口乾心煩兩頰黑色皮

膚乾燥（出聖惠方）

龍骨（一兩）　白芍藥　人參（去蘆頭）　鹿茸（塗醋微炙去毛各半兩）

白茯苓各三分 桂心 甘草炙微赤剉 熟乾地黄 磁石一兩半搗碎水淘去赤汁

右為散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓食前温服

鹿角散出聖惠方 治傷寒後虚損夜夢洩精不禁

鹿角屑 麋角屑 當歸剉微炒各一兩 白茯苓 芎藭各三分

右為散每服三錢水一中盞入薤白三莖生薑半分

粳米一百粒煎至六分去滓食前温服

牡蠣散 治傷寒後虚損心多忪悸夜夢洩精

牡蠣燒為粉 桂心 白芍藥 鹿茸塗醋微炙去毛 龍骨各一兩 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分去滓食前温服

石斛散 治傷寒後腎氣虚損小便餘瀝及夜夢精隂下濕痒

石斛去根剉一兩半 巴戟一兩去心 桑螵蛸微炒三分 兎絲子一兩酒浸三日曝乾別杵為末 杜仲三分去粗皮炙微黄剉

右為細散入兎絲末和勻每服食前以温酒調下二錢

韭子散 治傷寒後腎臟虛損夜夢失精及尿後餘瀝

韭子三兩微炒 麥門冬一兩半去心焙 鹿茸一兩塗酥炙去毛 龍骨一兩 兎絲子一兩湯浸三日曝乾別研為末 車前子一兩

右為散入兎絲子末和勻每服食前以温酒調下二

錢

著蕷散　治傷寒後虛損腎氣乏弱精滑夜夢多遺

著蕷　韭子微炒　麥門冬去心焙　熟乾地黄　兎絲子曝乾別杵為末　車前子　龍骨已上各一兩　芎藭三分

右為細末入兎絲子和勻每服食前以温酒調下二

錢

桑螵蛸散　治傷寒後虛損乏力陰痿夜夢失精

桑螵蛸微炒　韭子微炒　兎絲子酒浸三日曝乾別杵為末　牡蠣燒為粉

車前子各一兩 麥門冬一兩半去心焙

右為細散入兔絲子末和勻每服食前以溫酒調下二錢

韮子散 治傷寒後虛損夜夢精滑或因小便亦有精出

韮子微炒 龍骨 兔絲子酒浸三日曝乾別杵為末 人參去蘆頭 澤瀉已上各一兩 麥門冬一兩半去心焙 車前子三分 石龍芮三分

右為細末入兔絲子末和勻每服食前以溫酒調下

二錢

鹿茸丸 治傷寒虛損小便如泔及有餘瀝夜夢精洩此皆腎虛

鹿茸塗醋微炙去毛 澤瀉 白茯苓 牛膝去苗 桂心各一兩

龍骨 韮子微炒 石龍芮各一兩半 兎絲子二兩酒浸三日曝乾別杵為末

右為末煉蜜和擣三五百杵丸如桐子大每服以溫酒下三十丸空心及晚食前服

羚羊角丸　治傷寒後夜夢精洩不禁身體枯燥瘦瘠骨立者宜服

羚羊角屑　犀角屑　石龍芮　桂心　木香已上各一兩　韭子微炒　龍骨　硃砂細研水飛過　鹿茸酒浸微炙去毛　澤瀉已上各一兩半

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服食前以温酒下三十丸

硃砂丸　治傷寒後虛損心氣不安夢寐失精

硃砂細研水飛過　羚羊角屑　人參去蘆頭　白茯苓已上各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸

普濟方卷一百四十四

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百四十五 六

詳校官太醫院御醫臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄録監生臣龔輝遠

普濟方卷一百四十五　明　周王朱橚　撰

傷寒門

傷寒後虛驚悸附論

夫傷寒後虛損心氣不足致多驚悸此由邪熱乘於心也心主於血心主於神血脉亂則神氣不定故令驚悸也又云傷寒病後心氣不足風邪乘之則令精神不寧恍惚驚悸此由憂愁思慮致心氣虛邪氣內乘故神

氣不得安定而生驚悸也

方

白茯苓散出聖惠方 治傷寒後心虚驚悸或時妄語四肢煩熱肌體羸瘦

白茯苓 石膏 人參去蘆頭 熟乾地黄各一兩 半夏湯洗七次去滑 黄芩 桂心 麥門冬 遠志各一兩半

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓下飴糖一分攪令勻不計時候温服

紫石英散出聖惠方　治傷寒後心虛驚悸煩悶及咽喉不利面目忽赤忽黄虛羸少力

紫石英細研　桂心　紫菀洗去苗土　白茯苓各一兩　麥門冬去心焙一兩半　人參去蘆頭　黄耆剉各一兩　甘草炙微赤剉半兩　熟乾地黄二兩

右為散入石英和匀每服五錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候温服

人參散出聖惠方　治傷寒後心虛驚悸恍惚不安

人參去蘆頭 茯神去木各一兩 陳橘皮三分湯浸去白焙 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩微炒一分

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時溫服聖濟方無棗三枚煎至半盞名人參茯神湯

龍齒散出聖惠方 治傷寒後心虛驚悸煩熱口乾頭項時疼

龍齒一兩 子芩 防風去蘆頭 茯神各三分 川升麻

大青各半兩 人參三分去蘆頭 石膏一兩

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓入竹瀝半合攪勻不計時候溫服

遠志散出聖惠方 治傷寒後心虛驚悸恍惚多忘或夢驚魘及諸不足

遠志去心 人參去蘆頭 龍齒 茯神 紫石英細研 赤石脂 當歸剉微炒 桂心 甘草炙微赤剉 白朮 白芍藥 紫菀洗去苗土 防風 麥門冬去心焙各一兩

右為散入石英相和匀每服五錢水一大盞入棗三枚煎至五分去滓不計時候温服

茯神散 出聖惠方 治傷寒後虛羸心氣乏弱驚悸多忘

茯神 黄耆炙 菖蒲各一兩 白芍藥 人參去蘆頭各一兩 遠志去心三分

右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

龍齒丸 出聖惠方 治傷寒後伏熱在心心虛驚悸

龍齒 人參去蘆頭 茯苓 生乾地黃各一兩 遠志去心

鐵粉細研各三分 防風去蘆頭三分 麥門冬一兩半去心焙 黃連去鬚

馬牙硝細研三分 麝香半分細研三分

右為細末都研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二

十丸竹葉金銀湯下不計時候

防風丸出聖惠方 治傷寒後心虛驚悸精神昏亂煩悶四

肢沉重不能飲食

防風一兩半去蘆頭 茯神一兩半 人參一兩半去蘆頭 天門冬一兩半去

黄連半兩去鬚　豉一合心焙　白术二兩土炒

右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸粥飲下不計時候

人參丸出聖惠方　治傷寒後心虛驚悸卧起不安食全少

人參去蘆頭　茯神各三分　黄連去鬚一兩　麥門冬一兩去心焙　白术三分土炒　栢子仁三分去油　枳殼三分麩炒微黄去心穰　黄耆三分剉　甘草三分炙微赤剉　陳橘皮半兩湯浸去白穰焙　厚朴半兩去麄塗生薑汁炙　龍齒三分

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸粥飲下不計時候

定志丸出聖惠方 治傷寒後或用心力勞倦四肢煩弱心虛驚悸翕翕短氣

茯神一兩 遠志半兩去心 麥門冬一兩半去心焙 人參三分去蘆頭

熟地黄一兩 甘草半兩炙微赤剉 黄耆三分剉 桂心半兩 牛膝半兩去苗 澤瀉半兩

右為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十丸以粥飲

下不計時候

酸棗仁丸出聖惠方　治傷寒後心虛驚悸發即恍惚不定睡卧不安

酸棗仁三分微炒　枸杞子三分　甘菊花三分　白茯苓三分

人參三分去蘆頭　防風三分去蘆頭　桂心三分　栢子仁三分

遠志半兩去心　天門冬去心焙一兩半　赤石脂一兩　龍齒一兩

右為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十丸粥飲下不計時候

黃耆丸 出聖惠方 治傷寒後心虚驚悸恍惚不定

黃耆 剉 人參 去蘆頭各半兩 龍齒 一兩 茯神 三分 鐵粉 一兩細研 金銀箔 各五十片細研 防風 半兩去蘆頭 遠志 半兩去心 熟乾地黃 三分

右爲細散入鐵粉金銀箔都研令匀鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸粥飲下不計時候

龍齒丸 出聖惠方 治傷寒後心虚驚悸神氣不定

龍齒 一兩 人參 去蘆頭一兩 虎睛 一對酒浸一宿微炙 茯神 一兩 犀角屑 一兩 龍膽 一兩去蘆頭 鬼臼 三分去鬚 桂心 一兩 防風 半兩去蘆頭

遠志三分去心 甘草一分炙微赤剉 麝香一錢細研

右為末麝香研令勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十丸不計時候金銀湯下

羚羊角丸出聖惠方 治傷寒後心肺壅熱背髆煩悶心虛驚悸眼澁口乾

羚羊角三分 川升麻 梔子仁各一兩 玄參三分 麥門冬去心焙 龍齒各一兩半 金銀箔各五十片與馬牙硝同研令細 茯神一兩半 知母一兩 防風一兩去蘆頭 子芩一兩 赤芍藥一兩 大麻仁一兩

半另研如膏 馬牙硝二兩細研

右為末入金銀箔馬牙硝麻仁同研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸竹葉湯下不計時候

人參湯 治傷寒後壅熱心忪驚悸

人參三分 犀角屑 甘草炙 黃芩去黑心 玄參堅者 秦艽去苗土 地骨皮各半兩

右麄擣篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓下竹瀝一合攪勻食後温服

茯神湯　治傷寒後心熱煩夢睡多驚悸

茯神三分去木　犀角屑　龍齒各一兩　麥門冬去心焙一兩　升麻半兩　玄參堅者半兩　竹茹一兩　芍藥三分　馬牙硝一兩半

右麄擣篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓下地黄汁一合攪令匀食後温服

麥門冬飲　治傷寒後心忪驚悸煩熱口乾

麥門冬去心焙一兩　龍齒三分　山梔子仁　玄參堅者各半兩　芍藥三分　木通剉一兩　人參　茅根各三分

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎同煎至七分去滓下生藕地黄汁各一合攪匀食後分温二服

犀角湯出濟生拔萃方 治傷寒後伏熱在心怔忪驚悸不得眠睡

犀角屑半兩 茵陳蒿三分 茯神去木二兩 山梔子仁半兩 芍藥一兩半 麥門冬去心焙一兩半 生乾地黄二兩焙

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎

竹葉三七片同煎至七分去滓食後温服

前胡湯　治傷寒後驚悸不定

前胡去蘆頭　茯神去木　人參各一兩　遠志去心一兩半　甘草炙一分

右麄擣篩每服二錢匕水一盞同煎至七分去滓温服不計時候

麥門冬湯　治傷寒後心虚忪悸

麥門冬去心焙　茯神去木　菊花　人參各一兩　甘草炙半兩

右麄擣篩每服三錢匕水一盞煎至半盞去滓温服

紫石英湯　治傷寒後驚悸煩悶虛羸少力

紫石英研　桂去麄皮　紫菀去苗土　白茯苓去黑皮　麥門冬去心焙　人參　黄耆剉各一兩　甘草炙半兩

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘破煎至七分去滓温服不計時候

龍骨湯　治傷寒後心氣虛悸恍惚多忘或夢寐不安

龍骨研　人參　茯神去木　紫石英研　赤石脂　當歸

切焙乾薑炮桂去麄皮甘草炙白朮芍藥紫菀去苗土防風去蘆各一兩遠志去心焙半兩

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘破同煎至七分去滓食前溫服

茯神丸　治傷寒後或用心力勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸吸短氣

茯神去木麥門冬去心焙熟乾地黄焙各一兩牡丹皮人參黄耆剉各三分桂去麄皮甘草炙牛膝去苗澤瀉各半兩

右擣羅為末錬蜜和擣三百杵丸如梧桐子食前温酒下二十丸

傷寒後夾勞 附論

夫傷寒後氣血未實臟腑尚虚餘毒之氣猶存淹延時日不瘥肌體羸瘦肢節痠痛壯熱憎寒心煩盗汗上氣咳嗽嘔逆痰涎飲食不消腹中癖塊口乾舌澀折骨痿面赤青黄氣力虚弱此皆由虚損致成夾勞也　又云傷寒瘥後復夾勞者由病人先有夙疾因汗下之後榮

衛虛弱氣不復常行體羸少力時有盜汗寒熱不常喘欬嗽痰唾鼻中臭氣飲食不消肢體痠痛面黄頰赤不即治之則致危殆

方

前胡散 治傷寒後夾勞寒熱時作欬嗽盜汗四肢疼痛頰赤面黄心胸不利

前胡一兩去蘆頭 白鮮皮 柴胡去苗 桑根白皮剉 大腹皮剉 黄耆剉 訶梨勒皮 白术 青橘皮湯浸去白穣焙

各三分半夏二兩湯浸七遍去滑甘草半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候温服

柴胡散　治傷寒後夾勞骨節煩疼時有寒熱欬嗽頭痛

柴胡去苗貝母煨令微黄白朮半兩人參去蘆頭赤芍藥石膏各一兩黄芩三分知母梔子仁半兩杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄鼈甲一兩炙

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

熟乾地黄散　治傷寒後夾勞骨節疼痛不能飲食四肢少力

熟乾地黄一兩　黄芩三分　白芍藥一兩　五味子三分　桂心半兩　甘草半兩炙微赤剉　當歸半兩剉微炒　半夏湯浸七次去滑　人參半兩去蘆頭

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分

去滓不計時候温服

鼈甲散　治傷寒後夾勞四肢煩熱骨節疼痛不思飲食時時欬嗽心胷痰壅

鼈甲一兩半塗醋炙令去裙襴　柴胡一兩半去苗　秦艽半兩去苗　紫菀半兩

桔梗三分去蘆頭　麻黄三分去根節　知母三分　桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄　半夏半兩湯浸七次去滑　桂心半兩　黄耆三分剉　陳

橘皮半兩湯浸去白穰焙

右為散每服五錢以水一大盞入薑半分煎至五分

去滓不計時候温服

柴胡散　治傷寒後夾勞體瘦少力四肢疼痛心膈痰壅時有欬嗽不思飲食

柴胡一兩去苗　鼈甲一兩塗醋炙令黃去裙襴　白朮三分　人參三分去蘆頭　天門冬一兩去心　桑根白皮半兩剉　枳殼半兩麩炒微黃去瓤　桂心半兩　當歸半兩剉微炒　百合三分　紫菀三分洗去苗土　桔梗半兩去蘆頭　款冬花半兩　麥門冬半兩去心　陳橘皮半兩湯浸去白瓤焙　黃芩半兩　枇杷葉三分拭去毛炙令黃　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候温服

紫蘇散　治傷寒後夾勞脾胃氣虛心腹煩悶壯熱憎寒飲食不多欬嗽痰涎腦悶小便黄赤

紫蘇莖葉一兩　赤茯苓三分　麥門冬半兩去心　木香半兩　人參一兩去蘆頭　陳橘皮三分湯浸去白穰焙　紫菀半兩洗去苗土　柴胡三分去苗　桂心三分　當歸三分剉微炒　半夏三分湯浸七次去滑　白朮半兩　知母半兩　桑根白皮半兩剉　犀角屑半兩　黄芩半兩　檳榔半兩　枳殼

三分麸炒微黄去穰

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分不計時候温服

犀角散出聖惠方　治傷寒後夾勞煩熱四肢疼痛不欲飲食

犀角屑三分　赤茯苓三分　枳殻三分麸炒微黄去穰　柴胡一兩半去苗　白术三兩　鼈甲一兩半塗醋炙令黄去裙襴　知母半兩　赤芍藥三分　甘草半兩炙微黄剉

右為散每服五錢以水一盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候温服

秦艽散 出聖惠方 治傷寒後夾勞黄瘦體熱四肢煩疼不欲飲食

秦艽 一兩去苗 人參 三分去蘆頭 鼈甲 一兩塗醋炙令黄去裙襴 白朮 一兩 半夏 半兩湯浸七次去滑 五味子 半兩 甘草 半兩炙微赤剉 柴胡 一兩去苗 黄芩 半兩 桔梗 半兩去蘆頭 麥門冬 半兩去心 黄耆 一兩剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候温服

旋覆花散出聖惠方 治傷寒後夾勞胸膈痰壅不思飲食氣攻背膊腰脊痠疼

旋覆花一兩 半夏三分湯浸七次去滑 麥門冬半兩去心 知母半兩 甘草半兩炙微赤剉 赤芍藥半兩 柴胡三分去苗 人參半兩去蘆頭 陳皮半兩湯浸去白穣焙 百部半兩 赤茯苓三分 前胡一兩去蘆頭

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候温服

木香丸出聖惠方 治傷寒後夾勞四肢無力脾氣弱飲食無味肩背疼痛

木香半兩 鼈甲一兩塗醋炙令黃去裙襴 白茯苓三分 柴胡一兩半去苗 半夏半兩湯浸七次去滑 桔梗三分去蘆頭 枳殼三分麩炒微黃去穰 五味子半兩 陳橘皮三分湯浸去白穰焙 黃耆半兩剉 桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 白芍藥一兩

右為末鍊蜜丸擣三二百杵丸如梧桐子大每服三十丸不計時候以粥飲下

獺肝丸 出聖惠方 治傷寒後夾勞煩熱口乾燥四肢疼痛不欲飲食漸加羸瘦

獺肝一兩微炙 生乾地黃一兩 知母三分 前胡一兩去蘆頭 虎頭骨三分微炙 地骨皮一兩 黃芩三分 川升麻三分 白朮三分 枳殼三分麩炒微黃去瓤 玄參三分 栢脂三分細研

右為末入栢脂和勻鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時以溫豉湯下二十丸

天雄丸 出聖惠方 治傷寒後夾勞羸瘦或時憎寒臥即汗

出手足時顫頻赤面黄

天雄一兩炮去皮臍 人參一兩去蘆頭 防風一兩去蘆頭 鹿茸一兩去毛

塗酥炙微黄 遠志一兩去心 牡蠣二兩煆為粉 薯蕷一兩 澤瀉一兩 牛

膝一兩去苗 黄耆一兩剉 五味子三分 山茱萸三分 肉蓯蓉一兩

酒浸一宿剉去皺皮炙乾 桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄 熟乾地黄一兩

右為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服食

前以薑橘湯下三十九

木香丸 治傷寒後夾勞四肢無力脾虚胃弱飲食無

味向晚潮熱手足心熱漸覺黃瘦

木香 鼈甲去裙襴醋浸炙各一兩 羌活去蘆頭三分 柴胡去苗一兩

半夏湯浸七遍去滑半兩 桔梗 知母焙 陳橘皮湯浸去白炒各三分

五味子 秦艽去苗 天靈蓋酥炙各半兩 桃仁湯浸去皮尖雙仁炒研如膏四兩

右擣篩十一味為末與桃仁同研匀鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心米飲下二十丸晚再服

羌活散 治傷寒後夾勞肢體煩疼早晚虛熱口苦嗌

乾夜卧多汗手足麻痺及風勞等症

羌活去蘆頭 白朮 黄耆剉 青橘皮湯浸去白炒 甘草炙

附子炮裂去皮臍 五加皮用茱萸半兩水一碗煎水盡焙乾去茱萸各一兩 桂去麄皮 乾薑炮各半兩

右擣篩為散每服二錢匕温酒調用水一盞生薑三片棗一枚擘破煎至七分温服亦不拘時

人參湯 治傷寒後夾勞骨節疼痛渾身壯熱氣力虚乏之

人參　桔梗炒　白术　芍藥　紫菀去苗土　白茯苓
去黑皮　檳香子炒各一兩　秦艽去苗土三分　甘草炙一兩半　柴胡去苗
陳橘皮湯浸去白炒　蒼术米泔浸洗切炒　羌活去蘆頭各二兩
右麄擣篩每服三錢匕水一盞薑三片棗一枚擘破
同煎至七分去滓温服不拘時
知母湯　治傷寒後夾勞四肢煩痛日漸虛羸唇紅頰
赤
知母焙半兩　犀角屑　地骨皮　前胡去蘆頭　白鮮皮

柴胡去苗 赤茯苓去黑皮 人參 黃耆剉各一兩

右麄擣篩每服三錢七水一盞生薑三片煎至七分去滓食後温服

鼈甲散 治傷寒後骨蒸勞熱日漸黃瘦大便澀小便赤

鼈甲去裙襴醋浸炙一兩 知母切焙半兩 大黃剉醋炒 甘草炙剉 桑根白皮剉各一兩 木香剉半兩

右麄擣篩每服三錢七水一盞童子小便三分葱白

三寸煎至七分去滓早晚食後温服

黄耆鼈甲湯 治傷寒後病瘥後夾勞形體羸瘦或寒或熱如瘧狀四肢煩疼

黄耆剉 鼈甲去裙襴醋浸炙各一兩 知母焙 白木 桑根白皮各半兩 甘草炙剉 陳橘皮湯浸去白炒各三分

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半葱白三寸生薑三片煎至一盞去滓食後温服

柴胡湯 治傷寒後夾勞五心煩熱背膊疼痛手足無

力不能飲食

柴胡去苗 黄耆剉 赤茯苓去黑皮各一兩 秦艽去苗土 地骨皮

黄芩去黑心炒 葛根剉 枳殻去瓤麩炒各半兩 人參 甘草

炙各三分 鼈甲去裙襴醋浸炙一兩

右麄擣篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分

去滓不拘時候温服

虎骨湯 治傷寒後夾勞寒熱乍進乍退

虎頭骨塗酥炙 知母焙各半兩 甘草炙 鼈甲去裙襴醋浸炙 人參

去蘆黄耆剉各一兩

右麄擣篩每服三錢匕水一盞童子小便三分生薑三片葱白三寸煎至七分去滓不拘時候温服

人參鼈甲湯　治傷寒後夾勞寒熱往來進退不時頭疼體痛口苦咽乾不思飲食

人參　鼈甲去裙襴醋浸炙　附子炮製去皮臍　柴胡去苗各一兩　桃仁去皮尖雙仁炒　芍藥　知母焙　桂去麄皮　烏梅去核炒　陳橘皮湯浸去白炒　當歸切焙　秦艽去苗土　羌活去蘆頭　五味子各半兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓早晚食前温服

人參丸　治傷寒後夾勞四肢無力骨節煩疼不思飲食

人參　前胡去蘆頭各一兩　乾薑炮半兩　鼈甲去裙襴醋浸炙　桔梗剉炒　甘草炙各三分

右為末錬蜜和丸如梧桐子大每服二十丸生薑棗湯下不拘時候

前胡湯　治傷寒後百節疼痛變為氣勞發熱盜汗

前胡去蘆頭　桔梗各一兩　龍膽　甘草炙各半兩　柴胡去苗三兩

烏梅去核炒一分

右麄擣篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎至七分去滓温服不拘時候

當歸湯　治傷寒後夾勞羸瘦盜汗寒熱不常喘欬痰唾飲食減少

當歸切焙　代赭石研　黄連去鬚各三分　桂去麄皮　桑根白皮

剉焙附子炮裂去皮臍陳橘皮湯浸去白焙黄芩去黑心各半兩白朮土炒厚朴去麁皮生薑汁炙木通微炙剉地榆各一兩桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒二十枚

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓温服

傷寒後虚羸盗汗

夫傷寒瘥後體氣羸熱臓腑猶虚或每因睡中遍身汗出此皆陽氣虚心氣弱陽屬於表主於膚腠理開泄故

津液妄行心主血心生汗今心虚不足故多盗汗診其脉虚弱微細者是也　又云傷寒盗汗者謂不睡則不能汗睡而汗出者也自汗則不然或睡與不睡自然而出也又盗汗者不睡則不能汗出方其睡也湊湊然出焉覺則止而不復出矣雜病盗汗者責其陽虚也傷寒盗汗者非若雜病之虚是由邪氣在半表半裏使然也何者蓋邪氣一切在表干於衛則自然汗出也此則邪氣侵行於裏外連於表邪及睡則衛氣行於裏乘表中

陽氣不緻津液得泄故但睡而汗出覺則氣散於表而汗止矣經曰微盗汗出反惡寒者表未解也又陽明病當下則裏實脉浮者亦必盗汗是猶有表邪故也又三陽合病自汗是知盗汗為邪氣在半表半裏之間明矣且自汗有為之虚者有為之實者其於盗汗之證非若自汗有實者悉當和表而已不可不知也且汗者心之液傷寒瘥後眠寢有汗者由心氣偏虚榮衛不足腠疎表弱故寢寐之間而多盗汗久不已日漸羸瘦肢體痿

弱也

方

鼈甲散出聖惠方治傷寒後虛羸盜汗不止四肢無力向晚增寒

鼈甲三分塗醋炙微黃去裙襴　蒼朮一兩微炒　附子三分炮裂去皮臍　甘草三分炙微赤剉　人參三分去蘆頭　黃耆三分剉　熟乾地黃三分　肉蓯蓉三分酒浸一宿刮去皺皮炙乾　桃仁三分酒浸去皮尖雙仁麩炒微黃　牛膝三分去苗　柴胡三分去苗　五味子三分　枳殼三分麩炒微黃去瓤　杜仲三分去麤

皮炙微黄剉　牡蠣一兩煆如粉

右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候温服

杜仲散出聖惠方　治傷寒後虚羸夜多盗汗口乾心躁

杜仲一兩去麄皮炙微黄剉聖濟方二兩　牡蠣一兩半煆為粉　麻黄根一兩半

白术三分聖濟方一兩　白茯苓三分聖濟方一兩　黄耆一兩剉　白芍藥一兩　甘草半兩炙微赤剉　人參三分去蘆頭　肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候温服

治傷寒後虛羸日夜汗出不止心躁口乾咽喉不利出聖惠方

黄雌鷄一隻去腸胃理如食法　肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮切　麻黄根一兩　牡蠣二兩煅為粉

右先將鷄麻黄根以水七大盞煑取汁三大盞去鷄麻黄根後下蓯蓉牡蠣煎取一盞半去滓分為三服

以空心午前後夜卧時温服

治傷寒後虚羸盗汗不止出聖惠方

右用熟乾地黄五两細㕮咀以水三大盞煎至一大盞半去滓分為三服空心午前後臨卧時服

又方出聖惠方

右以栢木葉不限多少濃煮取汁飲之

又方出聖惠方

右以白术為細末每服用新汲水下二錢日三四服

聖濟方用菖蒲湯下

又方出聖惠方

右以韭根四十九莖以水一大盞煎至五分去滓頓服

又方出聖惠方

黄耆一兩剉 牡蠣粉一兩 白术一兩

右以水三大盞煎至二盞去滓食後温飲一中盞

撲身止汗散出千金方 治傷寒後虚羸盗汗不止

麻黄根二兩千金方作三兩 雷丸三兩 牡蠣三兩煅為粉 乾薑一兩炮剉

甘草一兩炙微赤剉 米粉五合千金方作二兩

右為散每用白綿裹五兩撲身體汗即止

又方出聖惠方

蛤粉半斤 麻黄根四兩 滑石五兩

右為散每用薄綿裹五兩撲身體汗即止

人參湯 治傷寒後體虛夜卧汗出不止頭旋惡心不

思飲食

人參　半夏湯洗去滑生薑炒製　麻黄根　黄耆剉各一兩　牡蠣粉二兩　防風去蘆三分

右麄擣篩每服五錢以水一盞半生薑三片煎至八分去滓不計時候温服

麻黄根湯　治傷寒後虚汗不止

麻黄根剉　黄耆剉各一兩　五味子炒半兩　牡蠣煆二兩　甘草剉各一兩

右麄擣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓不拘

時候温服

茯苓湯　治傷寒後汗出不止漸覺虛羸少力

白茯苓去黑皮　牡蠣煅各一兩　芍藥三分　肉蓯蓉切焙　五味子炒　甘草炙剉　人參　白朮　麻黄根各五錢

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓不拘時候温服

人參湯　治傷寒後盜汗不止心多煩躁驚悸

人參一兩　遠志去心一兩　甘草炙剉　白茯苓去黑皮剉　竹茹　麥

門冬去心焙　黄耆剉　柴胡去苗　桔梗剉炒　龍骨煅各半兩

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗一枚擘破煎至八分去滓不拘時候温服

壯蠣散　治傷寒後羸劣虚汗不止

壯蠣煅一兩　白茯苓去黑皮剉　人參　白朮　芍藥　龍骨煅　熟乾地黄焙乾各半兩

右擣羅為散每服二錢匕米飲調下不拘時候

黄耆散　治傷寒後虚劣不思飲食汗出不止

黄耆剉　白茯苓去黑皮　人參　白朮各一兩　牡蠣煅一兩

麥門冬去心焙　陳橘皮去白切焙各半兩

右擣羅為散每服三錢匕米飲下不拘時候

黄耆散　治傷寒後虚汗不止

黄耆剉　麻黄根剉各一兩　牡蠣煅二兩　知母焙半兩

右擣羅為散每服二錢濃煎小麥湯調下不拘時候

黄連散　治傷寒後體虚盗汗不止

黄連去鬚一兩　牡蠣煅二兩　白茯苓去黑皮三分　甘草炙半兩

右擣羅為散煎竹葉湯調下二錢不拘時候

治盜汗腠理開疎粉汗方

牡蠣半斤煅如粉　麻黄根一兩擣羅為末

右同研匀寢寐中有汗處使傅之

治盜汗及汗無時方出千金方

右豉一升以酒二升漬三日服不瘥更合服不過三

劑即愈

止汗方出肘後方

杜仲　牡蠣

右各等分為末臨卧用開水調服五錢

牡蠣散出千金方　治卧即盜汗風虛頭痛筋惕肉瞤

牡蠣　白朮　防風各三兩

右為散酒服方寸匕日二服止汗無出此方一切泄汗服之三日皆愈神驗汗止便服小建中湯

桂枝芍藥湯　治傷風自汗咽乾胸腹滿自利不渴倦怠手足自溫肺脉絃大而緩

桂心半兩 白芍藥三兩

右為散每服五錢薑三片棗一枚煎服仲景用桂枝一兩半

黄耆湯出椒粹方 治傷寒内傷拘急三焦氣虚自汗及手足自汗或手背偏多或肢體振摇腰膝沉重面赤目紅但欲眠睡頭面壯熱兩脇熱甚手足自温兩手心熱自利不渴大便或難或如常或口乾咽燥或渴欲飲湯不欲飲食嘔噦間作或心下滿悶腹中疼痛或

時喜笑或時悲哭或時太息或語言妄亂失志世疑作譫語狂語者非也此神不守舍耳故寢寐之間或恐或悸頭項不甚痛行步不復如舊陰氣盛陽氣虛也兩手脉浮沉不一或左右往來無定沉濇弱弦微五種陰脉形狀舉按全無力者宜先緩而後急緩宜用黄耆湯甚者加乾薑炮

人參　黄耆　白茯苓　白术　白芍藥各一兩　甘草七錢半　生薑半兩如無以乾者代之　陳皮半兩　嘔者加藿香半兩

右㕮咀水煎量證大小加減多少用之可也如大便結者調中丸主之

調中丸（出拔粹方）

人參　白茯苓（去皮）　乾生薑　白朮　甘草（各等分）

右為細末錬蜜為丸每兩十丸或五丸每服一二丸水少許煎服之　若病重急治者黄耆湯内每服加乾薑一錢大便結者理中丸主之

理中丸（出拔粹方）

人參 白术 甘草 乾薑炮恐熱以生薑代之

右等分錬蜜為丸每服作五丸白湯化下或水煎服亦得緩後治急也若尤急者無汗宜附子乾薑甘草湯 若自汗者宜附子白术甘草湯量脉證可宜四逆湯真武湯通脉四逆選而用之

救汗湯出朱氏集驗方 治陽虚自汗不止

芎藭三兩 官桂去皮取有味者三兩 甘草二兩 附子生用不去皮三兩

右㕮咀每服五錢水一盞半薑五片棗二枚同煎八

分去滓温服不拘時候合滓再煎服

又方出朱氏集驗方 治盗汗屢驗

太平白芷一兩 辰砂半兩

右為細末酒調下

牡蠣散出朱氏集驗方 治氣虚夜多盗汗

白术一兩 牡蠣大而白者火煆二兩另研極細 黄耆炙 防風不用叉尾者各一兩

右為末擣令極細方可服每服三錢温酒下日二三

服　如有虚出汗用防風不拘多少麩炒赤色研為細末煎猪皮湯下亦效

以上證蓋陽經虚皮膚發泄盗汗故有是證如傷風另有方治

龍膽湯 出楊氏家藏方　治傷寒汗後盗汗不止或婦人小兒一切盗汗並宜服之

龍膽草 不拘多少焙乾

右為細末每服三錢用水一盞點入温酒少許空心

臨卧調服

加减建中湯出經驗良方 治傷寒後自汗當補虛和陰陽

黄耆一兩 白芍藥三兩 甘草炙 熟地黄 人參各半兩

右㕮咀每服三錢水半盞煎至三分大人加倍服

大病瘥後多虛汗及眼中流淚方出肘後方

龍骨 牡蠣 麻黄根

右等分為末㩌身上良

養胃湯出如宜方 治體虛

半夏製 厚朴製 蒼朮各一兩 藿香 草菓 茯苓

人參各半兩 陳皮七分半 甘草二錢半

右㕮咀薑一片烏梅一枚煎服

傷寒後肺痿勞欬嗽附論

夫傷寒後肺痿勞嗽者是大發汗後因復下之則亡津液而小便反利者此為上虛不能制於下也上虛不能制於下者是虛邪之氣聚於上傷於肺使人欬嗽多骨熱而面虛腫久嗽不已遂成肺痿勞嗽之病也

方

麻黃散出聖惠方治傷寒後肺痿勞嗽四肢煩疼痰唾不止

麻黃三分去根節 桔梗一兩去蘆頭 天門冬一兩去心 白蒺藜一兩微炒去刺 紫蘇莖葉一兩 五味子一兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

柴胡散出聖惠方治傷寒後肺痿勞嗽連連不絕四肢煩

熱兩頰赤色飲食減少

柴胡（去苗） 桔梗（去蘆頭） 紫菀（洗去苗土） 知母 貝母（煨令微黃） 訶梨勒皮 百合（已上各三分） 烏梅肉（半兩微炒）

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓下地黃汁半合攪勻不計時候溫服

款冬花散（出聖惠方） 治傷寒後肺痿勞嗽唾如牛涎日夜坐卧不安脇下痛

款冬花 紫菀（去苗土洗） 桔梗（去蘆頭） 貝母（煨令微黃） 甘草（炙微

赤剉各半兩　桑枝一兩半剉　獺肝微炙　蛤蚧塗酥炙微黃　赤芍藥

赤茯苓各三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

鼈甲散出聖惠方　治傷寒後肺痿勞嗽涕唾稠粘骨節煩疼發渴寒熱

鼈甲塗醋炙微黃去裙襴　柴胡去苗各一兩　知母一兩半　赤茯苓

烏梅肉微炒各三分　款冬花　桑根白皮　甘草炙微赤剉

梔子仁三分 各半兩

右為散每服四錢以水一中盞入葱白二莖生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

紫菀散出聖惠方 治傷寒後肺痿勞嗽咳唾膿血連連不止漸將羸瘦

紫菀洗去苗土 天門冬去心 貝母煨令微黄各一兩 桔梗去蘆頭 生乾地黄各一兩半 百合 知母各三分

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候温服

牡蠣散出聖惠方 治傷寒後肺痿勞嗽唾多稠涎羸瘦喘促夜多盜汗

牡蠣一兩半煅為粉 紫菀洗去苗土 桔梗去蘆頭 萎蕤 黄耆剉 柴胡去苗各一兩 旋覆花 甘草炙微赤剉各半兩 沙參三分去蘆

右為散每服四錢入生薑半分煎至六分去滓入生地黄汁半合更煎一二沸温服不計時候

黄耆散出聖惠方 治傷寒後肺痿勞嗽涎唾不止

黄耆剉 赤茯苓 桔梗去蘆頭各三分 木通剉 桑根白皮

甜葶藶隔紙炒令紫色以上各半兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

五味子散出聖惠方 治傷寒後肺痿上氣痰嗽多唾稠粘胸膈不利

五味子 桑白皮剉各三分 細辛 陳橘皮湯浸去白穰焙 甘草炙微赤剉各一分 貝母煨令微黄半兩 柴胡去苗半兩 射干半兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候温服

麥門冬散出聖惠方 治傷寒後肺痿咳嗽氣喘唾血

麥門冬一兩去心 桔梗三分去蘆頭 紫菀洗去苗土 五味子 麻黄去根節 續斷 貝母煨微黄 桑根白皮剉各三分 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生地黄汁一分竹茹一鷄子大煎至六分去滓不拘時候温服

馬兜鈴散 出聖惠方 治傷寒後肺痿勞嗽上氣喘促

馬兜鈴半兩 桑根白皮一兩剉 甘草一分炙微赤剉 白前半兩

桔梗一兩去蘆頭 款冬花半兩

右為散每服三錢以水一中盞入燈心半束煎至六分去滓不計時候温服

貝母丸 出聖惠方 治傷寒後暴嗽喘急欲成肺痿勞嗽

貝母一兩半煨令微黃 桔梗去蘆頭 甘草炙微赤剉 紫菀洗去苗土各一兩 杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為末錬蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二十丸或丸如彈子大綿裹一丸含嚥津亦佳

天門冬丸出聖惠方　治傷寒後肺痿勞嗽唾成五色喘息漸急食少羸瘦

天門冬一兩半去心焙　大麻仁一兩另研如膏　桔梗一兩去蘆頭　川升麻三分　麻黄去根節　五味子　款冬花　紫菀洗去苗土　訶梨勒皮各三分　貝母煨令微黄　陳橘皮湯浸去白穰焙　甘草炙微赤剉　紫蘇子　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄各一兩　川大黄一兩切碎

微炒厚朴三分去粗皮塗生薑汁炙香熟

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫蜜水下二十丸

獺肝丸出聖惠方治傷寒後肺痿勞嗽涕唾稠粘日晚即發寒熱面心或赤心脇妨滿

獺肝半兩微炙 鼈甲三分塗醋炙令黃去裙襴 知母半兩 桔梗半兩去蘆頭 旋覆花半兩 川大黄三分剉碎微炒 柴胡三分去苗 栟櫚半兩 赤茯苓半兩 枳殼三分麩炒微黃去瓤 赤芍藥半兩 秦艽半兩去苗

右為細末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大不計時候以粥飲下二十丸

鍾乳散　治傷寒後肺氣虚寒咳嗽不止

鍾乳（鵝管者研如粉一兩）　款冬花　桂（去麄皮）　白礬（各三分）

右除鍾乳外為散再加鍾乳粉同研匀每用一匙安掌内以舌舐嚥之

華蓋湯　治傷寒後欬嗽肺經沉滯寒熱

甘草（炙）　麻黄（去根節湯煮掠去沫焙乾）　杏仁（湯浸去皮尖雙仁炒）　鹿角膠

炒剉半夏各一兩薑製

右麄擣篩每服三錢匕水一盞入生薑二片同煎至七分去滓温服早晩臨卧併三服汗出即瘥

百部湯　治傷寒後欬嗽痰涕不思飲食

百部一兩　欵冬花　紫菀去苗土　五味子　人參　半夏湯洗七次炒　前胡去蘆頭　桂去麄皮　麻黄去根節湯煮掠去沫焙各半兩

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分棗三枚擘破同煎至七分去滓食後温服

陳橘皮湯 治傷寒後肺氣壅塞欬嗽聲不出

陳橘皮湯浸去白焙 紫菀去苗土 人參 赤茯苓去黑皮 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒 桑根白皮剉各一兩 甘草炙剉 桔梗炒各半兩

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半入薑半分同煎至八分去滓温服

紫菀湯 治傷寒後欬嗽短氣涕唾稠粘及風虛煩躁發作無時

紫菀去苗土 紫蘇葉 白前 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒 麻黄

去根節湯煮掠去沫各半兩 甘草炙剉一分半 葶藶微炒一兩

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半入薑半分棗三枚擘破同煎至八分去滓食後温服

桔梗湯 治傷寒後欬嗽

桔梗炒一兩 紫菀去苗土一兩半 桑根白皮剉 赤茯苓去黑皮 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒 人參各一兩 甘草炙剉三分 貝母去心炮

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘破同煎至八分去滓食後温服

柴胡湯　治傷寒後欬嗽經旬未愈

柴胡去苗　桑根白皮　羌活去蘆頭　百合各一兩　當歸切焙

一兩半　石膏碎　麻黃去根節湯煮掠去沫焙　天雄去皮　枳殼去瓤

麩炒　黃連去鬚　貝母去心煨　五味子　桂去麁皮　白石脂

欵冬花各一兩　黃芩去黑心半兩　杏仁十枚去皮尖雙仁炒

右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑一分棗

三枚同煎至八分去滓温服

阿膠散　治傷寒汗下後欬嗽肺虛聲音嘶敗者

著蕷一兩 阿膠一兩炒 人參一兩 五味子一兩 麥門冬一兩去心 白朮一兩 乾薑三錢炮 桂枝五錢 杏仁三錢去皮尖

右剉細末每服七錢水二盞生薑烏梅各一錢同煎服

補肺散出濟生拔粹方 治傷寒汗下後喘咳不止恐致肺痿

人參一兩 五味子五錢 桑白皮二兩 款冬花五錢 蛤蚧一對

右為細末每服五錢沸湯一盞調服

桔梗湯出濟生拔粹方 治傷寒汗下後喘嗽煩躁氣滯濇邪

氣逆者

桔梗　桑白皮各一兩　甘草　貝母　訶黎勒各三錢

右剉細每服五錢水二盞入五味子烏梅肉各一錢同煎服

如聖加人參藿香杏仁湯出濟生拔粹方　治傷寒汗下後喘而噫氣者

甘草　桔梗　人參　藿香各五錢　杏仁三箇去皮尖

右剉細每服五錢水煎服

傷寒後發瘧

夫傷寒變成瘧者因病瘥後外邪未散真臟尚虛因為勞事致二氣交爭隂勝則發寒陽勝則發熱隂陽偏勝即往來寒熱休作有時也日再發者得汗必觧若傷寒八九日得之熱多寒少其人不嘔清便自調者欲自愈也或陽明證煩熱汗出日晡時發熱者脉浮宜觧表脉實宜攻裏又有婦人熱入血室發熱而更寒者當詳辨之

歌曰似瘧膀胱桂可醫清便不嘔半麻枝陽明實

下將須汗血室柴胡小者奇似瘧一名瘧狀作止有時非若寒熱往來或疎或數或作止無定時也凡感冒之人忽覺毛寒股慄筋搜百骸鼓撼嘔不欲食其寒不可禦未幾復轉而發熱者此即溫瘧不必謂瘧脉自弦或洪數或緊定時也或實或虛緩或刮濇皆為瘧狀但以外證別之用藥有本條然小柴胡湯如前斟酌加減亦是活法雖然血虛能生寒熱敗血亦作寒熱陰陽相勝雖一證名有一方其間當以川芎為任太陽似瘧證脉

洪浮與桂枝湯清便自可不嘔日三發桂枝麻黄各半湯其脉微緩則欲愈也陽明似瘧證煩熱汗出日晡發熱脉浮虛與桂枝湯脉實與承氣湯婦人熱入血室其血必結如瘧狀者小柴胡湯主之瘧後寒熱瘧後昏沉及諸瘧通用二陳湯多熱者加川芎前胡寒多者加川芎草菓

方

柴胡散出聖惠方 治傷寒後發瘧寒熱不定四肢無力心

煩頭痛不思飲食

柴胡（三分去苗）鼈甲（一兩半塗醋炙微黃去裙襴）知母（一兩）桑根白皮（一兩剉）旋覆花 甘草（三分炙微赤剉）天靈蓋（一兩半塗酥炙微黃）

右為散每服四錢以童子小便一中盞煎至五分去滓入地黃汁半合更煎一二沸不計時候温服

半夏散（出聖惠方）治傷寒後十餘日不解往來寒熱發如温瘧胸脇滿悶

半夏（湯浸七遍去滑）人參（去蘆頭一兩）柴胡（二兩去苗）赤茯苓（一兩）

甘草一兩炙微赤剉 瓜蔞根二兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

黄芩散出聖惠方 治傷寒後朝暮發寒熱或如瘧狀

黄芩 知母 葛根剉 麻黄去根節各一兩 甘草炙微赤剉

川大黄剉碎微炒各半兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候熱服以衣覆之汗出為效

鼈甲散　治傷寒後經數日發渴寒熱四肢煩悶喘息微急狀如瘧病

鼈甲一兩半塗醋炙微黄去裙襴　知母一兩　桑根白皮一兩半剉　甘草炙微赤剉　川大黄剉碎微炒各三分

右為散每服五錢以水一大盞入葱白三莖豉半合煎至五分去滓不計時候温服

烏梅散　治傷寒後勞動過多致成發瘧肢節不利

烏梅三分微炒　桔梗一兩去蘆頭　赤茯苓一兩　鼈甲塗醋炙微黄去裙襴

柴胡去苗各一兩 梔子仁一分 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候温服

治傷寒後發瘧動作無時方

川升麻二兩 恒山一兩 蜀漆一兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓空心温服良久當吐沫吐再服

松蘿散 治傷寒後發瘧或時寒熱

松蘿三分　烏梅肉一兩微炒　恒山一兩　梔子仁半兩　川升麻一兩　鼈甲二兩塗醋炙微黄去裙襴半

右為散每服四錢以水一中盞煎至七分去滓空心温服如人行五里再服以吐痰毒為度

治傷寒後毒氣不觧變成瘧狀發作無時寒熱不止

恒山二兩　鼈甲二兩半塗醋炙微黄去裙襴　川升麻一兩半　梔子仁一兩

右細羅為散每服二錢食前温水調服以吐為度

豉心丸　治傷寒後餘毒不散寒熱往來變成瘧狀

豉心一合　川大黄三兩剉碎微炒　恒山　川升麻各一兩　附子半兩炮裂去皮臍

右為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服食前以温水下二十一丸

治傷寒後發温瘧

恒山　川大黄剉碎微炒　黄丹炒令紫色各半兩

右為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服食前以升麻湯

下十五九

知母升麻湯　治傷寒後變成瘧病寒熱燥渴

知母　石膏　升麻各一兩　蜀漆　常山　甘草炙各一兩　烏梅去核半兩

右㕮咀每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

二黃湯　治傷寒後變成瘧疾口乾煩渴

麻黃去根節　大黃剉炒　瓜蔞根各一兩　甘草炙微赤半兩

右㕮咀每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

升麻前胡湯　治傷寒後變成瘧疾寒熱燥渴

升麻　前胡去蘆頭各一兩　知母焙　芍藥各三分　朴硝　山梔子仁　木通剉　烏梅去核各半兩　甘草炙剉一分

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一片棗一枚同煎至七分去滓入生地黃汁二合更煎一沸食後溫服

人參常山湯　治傷寒後變成瘧疾痰壅脾肺面色浮腫

人參　常山各半兩　生甘草　陳橘皮湯浸去白焙各一分　燈心十莖

右細剉拌匀用水二盞酒一盞同煎至兩盞去滓入好茶末二錢匕分作兩服取吐即瘥

黄芩鼈甲湯　治傷寒變成勞瘧久不瘥

黄芩去黑心　柴胡去苗　山梔子仁　烏梅去核各半兩　鼈甲

去裙襴醋炙一兩　甘草炙一分

右麄擣篩每服五錢匕用童子小便一盞半入桃柳尖各七箇生薑一片棗一枚豉半合同浸一宿平旦煎至七分去滓入生地黄汁一合攪匀更煎一沸温服不拘時

蜀漆鼈甲丸　治傷寒後肝瘧由邪熱客於足厥隂經所成顔色蒼蒼戰掉似熱勞

鼈甲去裙襴醋炙　蜀漆　知母焙　烏梅　苦參　常山

薑韲各一兩　豉一合熬　石膏二兩　細辛去苗葉　甘草炙各三分

右為末鍊蜜和擣數百下丸如梧桐子大每服十五丸空心温酒下晚再服

常山石膏湯　治傷寒後心瘧令人煩熱不止飲水多渴

常山　鼈甲去裙襴醋炙　犀角屑　蜀漆各一兩　甘草炙

烏梅去核各一分　山梔子半兩　石膏一兩半

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半入豉三七粒淡竹

葉二七片生薑一片棗一枚同煎至八分去滓食後温服日二

常山丸　治傷寒後脾瘧脾臓受熱或渇或不渇熱氣入内傷不得大便腹中熱痛身寒汗出

常山二兩　知母焙　鼈甲去裙襴醋炙各一兩　甘草炙半兩

右為末煉蜜和擣數百下丸如梧桐子大每服十五丸未發前温酒下發時再服

三味湯　治傷寒後肺瘧痰熱聚於胸膈令人心寒甚

則發熱熱則驚有所見者

常山一兩　秫米半合　甘草炙剉一分

右麄擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一片棗一枚同煎至八分去滓臨發時温服

常山柴胡湯　治傷寒後腎瘧令人悽悽腰脊痛而宛轉大便難手足寒

常山　柴胡去苗　麥門冬去心焙各一兩　烏梅去核　半夏湯浸七遍

炒乾　梹榔剉　枳殻去穰麩炒各半兩

右麄擣篩每服三錢匕水一盞入生薑一片棗一枚淡竹葉二十片豉二七粒同煎至七分去滓臨發時温服

太乙護命丸　治傷寒後變成瘧疾或取轉早隂氣結伏心下成塊或膨滿嘔逆喘哫面黒唇青四肢逆冷飲食不下并氣結食毒宜服此丸

陽起石　硫黄　附子炮裂去皮臍各一兩　金星石　銀星石　白石英　紫石英　礞石　滑石　硝石

凝水石煅　磁石火燒醋淬　太陰玄精石　耳鍋子鼎經銷金銀者

不灰木各半兩　丹砂一分　巴豆四十九粒去心及出油　杏仁四十九粒湯浸去皮尖雙仁炒

右為末再同研極細用阿魏一分與糯米粥同研勻丸如櫻桃大每服一丸麩炭火內燒赤取出兩隻盞子合在內候冷細研以生薑米飲下未好再服

茯苓散　治傷寒後熱不退成瘧時作

赤茯苓去黑皮　鼈甲去裙襴醋炙　地骨皮各三兩　柴胡去苗　知

母焙各一兩 枳殻去穰麸炒一兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓入生地黄汁一合食後良久温服如人行五六里再服

柴胡散出廣南衛生方 治傷寒後發瘧

柴胡一兩去苗 半夏二錢半湯浸七遍 桂枝二錢削淨秤 甘草一錢半炙

白芍藥二錢半去皮炒

右為末每服二錢水一盞半入生薑七片棗四枚同

煎至一盞去滓溫服寒熱纔愈便止此藥

小柴胡湯出如宜方　治先寒後熱熱多寒少

黄芩　人參　甘草各三兩　柴胡八兩　半夏製二兩半

右㕮咀薑五片棗一枚煎服寒多加肉桂寒熱相等不

加

五福丹出保生回車論

硃砂　硫黄　雄黄以上各一兩研細　硼砂　硝石以上各兩

半五味並用精者揀去砂石合研細

右用磁合子一個裏有油者用乳香少許香爐中燒烟起即熏合内入前藥貯定油調蛤粉固口再加紙筋泥固濟一指厚陰乾淨室中塼上坐合子醋拌灰少許擁抱合子上過口縫可一指厚以生炭三斤簇合周圍次又上熟炭火一斤在合上漸令通灼候火消至八分已上即撥開殘火候良久冷透開合取藥盡作汁如鏡面搥碎研極細粳米飯和丸如豌豆大及如粗菉豆大硃砂為衣每於發前一日臨卧時温

粥飲吞下一粒發作前一時溫粥飲再下一粒至日自愈

靈砂丹（一名龍虎丹出保生回車論）

硃砂（研細水飛晒乾）硫黄（研極細）

右二味各一錢研極細用醇酒八分一盞貯銀器或磁甌中用文武火熬將竹篾不住手攪熬至六分去火候冷以發作前一二時頓服忌口永不再發

又方

常山二兩細剉 鼈甲醋炙紫色二兩 芍藥三兩剉 黄連一兩 黄芩一兩

柴胡去苗二兩 甘草一兩炙 青蒿子一兩半如無用茵陳蒿

右為麄末每服五錢水二盞烏梅半兩以慢火煮至一盞去滓露一宿發作前一日進服於發作時再進一服即愈

傷寒發豌豆瘡滅瘢痕

夫傷寒之病發豌豆瘡者皆是熱毒所致其毒氣中於臓腑餘毒之氣衝於肌肉而生瘡瘐及其痊則瘡愈而

毒氣尚未全散故瘡雖落其瘢猶黶或凹凸肉起宜用消毒滅瘢之藥以傳焉

方

鷹糞白膏出聖惠方 治傷寒發豌豆瘡瘥後瘢痕不沒宜塗

鷹糞白半合 辛夷一兩 白附子一分 杜若二兩 細辛二兩

右搗碎以酒一升浸一宿入羊髓五兩慢火熬五七沸去滓傶於磁合中每用時新布揩瘡瘢令熱後以

藥薄塗之

朴硝膏出聖惠方 治傷寒後發豌豆瘡初瘥宜塗

川朴硝一兩細研如粉 猪膽一枚取汁

右調如膏摩瘡瘢上勿令動着任瘡痂自落

白芷膏出聖惠方 治傷寒後發豌豆瘡瘥後滅瘢宜塗

白芷 當歸各一兩 雞屎白五兩

右用猪脂七兩麻油三兩以慢火煎白芷當歸色黄去滓後將雞屎白攪和煎如膏入磁器内盛每日塗

摩瘡瘢上

白斂膏出聖惠方 治傷寒後豌豆瘡瘥後滿面瘡瘢久不沒宜塗

白斂三分 礬石半兩剉用 白石脂一分 杏仁一分湯浸去皮尖雙仁研如膏

右為細散次加杏仁膏研令勻後入新雞子白一枚酥二兩相和研為膏入磁器內每夜取塗面上來日以温漿水洗之

猪蹄湯洗方出聖惠方 治傷寒生豌豆瘡新瘥後滿面瘡

瘢

猪蹄一兩 川芎藭 萎蕤 桑白皮 白朮 白茯苓 商陸 白芷以上各半兩

右細剉先以水二斗煮猪蹄至一斗五升去猪蹄下藥煎至八分去滓每夜洗之

白附子膏出聖惠方 治傷寒生豌豆瘡瘥後瘢痕不消宜塗

白附子 密陀僧洗研為粉 川芎藭 白茯苓各半兩 牡

蠣（煆一錢）

右為細散更研令極細以酥調傅之

瓜蔞子膏 治傷寒生豌豆瘡瘥後瘢痕赤腫不消宜塗

瓜蔞子（一升湯浸擘取細研如膏） 白石脂（一兩搗羅為末） 麝香（一分細研） 雄雀糞（半兩白色者細研）

右研令匀用兎絲子苗研取自然汁調如膏夜間先煎葱白湯洗面後塗藥明旦以煖漿水洗之

玉屑膏（出聖惠方）治傷寒熱毒發豌豆瘡瘥後滿面瘢痕

玉屑　蜜陀僧　附子（生去皮臍擣為細末）　珊瑚（以上各一兩）

右研令細每度以藥末二錢用真牛酥調勻夜卧塗面來日以温漿水洗之

又方（出聖惠方）

鷹白糞（一兩半）　白僵蠶（二兩）

右先擣僵蠶為末次將鷹白糞同研如粉以白蜜調如稀餳塗於瘢上日二易之

又方 出聖惠方

杏仁 一兩湯浸去皮尖雙仁研如膏 雞子白 二枚

右和調如稀餳每夜塗瘡瘢上至旦以漿水洗之

又方 出聖惠方

雞子 七枚煮熟用黄 亂髪 一兩剪碎

右用銅銚子炒令髪消盡成油用薄綿濾入磁合中臧夜卧時塗摩之

又方 出聖惠方

馬齒莧自然汁五合 蛤粉二兩細研

右調和令勻每日塗搽

又方出聖惠方

升麻二兩 白蜜三兩

右用水一大盞煎升麻取半盞濾去滓下蜜更煎良久候冷漸漸取塗

普濟方卷一百四十五